

## 西園醫院 用藥指導單張

### 耳多贊邦點耳液劑

**用 途：**用於治療耳朵、外耳道感染

**使用說明：**

1. 使用藥品前，先將雙手洗淨擦乾。
2. 將藥水搖勻，打開蓋子，可看到軟管。
3. 請病患側頭或側躺，讓要點藥的耳朵朝上。
4. 輕拉耳朵，將耳道拉直。  
(3歲以上：往後往上拉；3歲以下：往後往下拉)
5. 按壓軟管使藥水滴入耳朵
6. 保持耳朵朝上約5~10分鐘，讓藥水吸收。
7. 等待期間可輕壓耳珠數次，幫助藥水流下。
8. 擦掉流出來的藥水，接著清洗雙手。
9. 若要點兩耳，用同樣步驟處理另一隻耳朵。
10. 使用完畢後，將蓋子蓋上。



**注意事項：**

1. 點藥時，軟管盡量不要碰到耳朵。
2. 清潔軟管時，用乾布或衛生紙等擦拭，不可直接用水沖洗。
3. 不要用棉花棒等物品伸入耳朵、把藥水吸乾。
4. 若藥水無法滴出，請拿回藥局處理，請勿用細針等物品戳軟管的孔。

**儲 存：**

1. 放置於常溫、乾燥陰涼處。
2. 開封後四週即不建議再使用，需丟棄。