

西園醫院用藥指導單張

Molnupiravir (COVID-19 治療口服抗病毒藥品)

適用對象：

適用於發病五日內，具有重症風險因子，未使用氧氣且 ≥ 18 歲之輕度至中度 COVID-19 確診病人，無法使用其他建議藥物者。

外觀：

橙色膠囊上有「82」字樣

用法：

1. 每 12 小時服用，**每次服用 4 顆** (例如：上午 8 點 4 顆和晚上 8 點 4 顆)，共服用 5 天。
2. 可與食物併服或不併服。需要整顆吞服，不要咀嚼、分開或壓碎錠劑。未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
3. 若忘記服藥，在平常服用的 10 小時內盡快服一劑。如果超過 10 小時才想起請略過，從下個劑量繼續按時使用，不可服用雙倍劑量。
4. 在完成 5 天治療之前，即使病情好轉，也不要停藥。

副作用：

腹瀉、噁心、暈眩等。現有的臨床資料有限，可能會發生嚴重和非預期的副作用。

注意事項：

1. 目前無腎、肝功能不全或老年病人劑量調整之建議。
2. 若正處於孕期或可能懷孕，請事先告知醫療人員；可能會對胎兒或幼兒造成傷害，不建議懷孕或哺乳期間使用，並在治療期間和使用最後一劑後 (女性 4 天、男性 3 個月) 正確避孕。
3. 用藥期間若仍有惡化徵象 (如：呼吸次數超過每分鐘 30 下、血氧飽和度 $\leq 94\%$ 、意識狀況改變等)，請盡速就醫。
4. 專案核予 EUA 以提供病人使用，故因使用此藥物後發生不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病時，不適用藥害救濟。
5. 請室溫保存於兒童不易取得之處所，避免存放於高溫或潮濕處。