

## 西園醫院 用藥指導單張

### Paxlovid (COVID-19 治療口服抗病毒藥品)

#### 適用對象：

適用於發病五日內，且具有重症風險因子之成人與 12 歲以上兒童 (體重大於 40 公斤) 的輕度至中度 COVID-19 確診者。

#### 成分含量：

Nirmatrelvir 150 mg 2 錠與 Ritonavir 100 mg 1 錠

#### 外觀：

Nirmatrelvir：為粉紅色、橢圓形速放膜衣錠，一側刻 PFE，一側刻 3CL；

Ritonavir：為白色、橢圓形膜衣錠，一側刻 H，一側刻 R9。

#### 用法：



1. 每天 2 次，每次服用 3 顆錠劑 (2 顆粉色和 1 顆白色)，連續使用 5 天。
2. 錠劑應整粒吞服，請勿剝半、磨粉或嚼碎。
3. 空腹或飯後服用均可
4. 在完成 5 天治療之前，即使病情好轉，也不要停止服用。

#### 副作用：

食慾不振、皮膚和眼白變黃 (黃疸)、深色尿、淺色糞便和皮膚搔癢，胃部 (腹部) 疼痛。味覺改變 (苦味)、腹瀉、血壓升高、肌肉疼痛。

#### 注意事項：

1. 本藥品之代謝會與多種藥物產生交互作用，進而影響彼此療效，若目前有服用其他藥品 (處方藥、非處方藥、中草藥等)，請主動告知醫師與藥師。
2. 若忘記服藥在平常服用的 8 小時內服一劑，請盡快服用。如果超過 8 小時才想起請略過，從下個劑量繼續按時使用，不可服用雙倍劑量。