

## 西園醫院 用藥指導單張

### Nitrostat (耐絞寧錠)

**學名：**Nitroglycerin 硝酸甘油

**商品名：**Nitrostat tablet 0.6mg

**藥品外觀：**白色，圓形錠，上有N及6字樣。

**用途：**本藥經舌下吸收後進入血液，可緩解或預防胸部疼痛（心絞痛）。

#### 使用方法：

1. 胸悶、胸痛時，應採坐姿，因藥效發揮時可能會發生頭痛、暈眩等反應。
2. 於心絞痛發作時含一粒於舌下（並非含於舌上），通常有灼熱感，藥效約兩分鐘出現，若舌下含5分鐘後症狀仍未緩解，顯示病情緊急，必須盡快就醫（建議打119叫救護車），再抵達醫院前，可每5分鐘含一粒舌下錠，總服藥顆粒數不可超過3粒。

#### 保存方法：

1. 耐絞寧舌下錠應保存於原藥罐中，切勿自行隨意分裝。此藥若長時間接觸空氣、濕、熱極易降低藥效，故每次使用後立即將瓶蓋扭緊並置於陰涼乾燥處保存，以確保藥效；開封後6個月，未使用的藥粒應丟棄，並請醫生新開一瓶。
2. 耐絞寧放久可能失效，請定期回診，並告知醫師您胸痛的頻率、嚴重度是否減輕。
3. 請隨時確認藥量是否足夠，尤其假日前或旅行前。
4. 孕婦或授乳婦用藥前請先告知醫師。
5. 請勿與威而剛（Viagra）、Cialis（犀利士）或Levitra（樂威壯）併用。

#### 服藥後出現下列症狀 請立即回診就醫：

1. 過敏反應：如皮疹、蕁麻疹、嘴部或喉嚨有刺痛、腫脹感、呼吸困難。
2. 嘴唇或指甲出現藍色、意識不清、視力模糊、口乾、胸痛加劇或心跳減慢。
3. 持續出現臉部潮紅、噁心、嘔吐等現象。