

西園醫院 用藥指導單張

Digoxin (隆我心錠)

商 品 名： Lanoxin 0.25毫克/錠

中 文 名： 隆我心錠

作 用： 主要是用於治療心臟衰竭及心臟跳動異常。

用藥方式：

1. 本藥品一日服用一次，請養成每日固定時間服藥的習慣。
2. 請確實依照醫師指示使用，不可任意突然停藥，若不知如何使用，請洽詢藥師。

注意事項：

1. 在用藥前，應告訴醫師過去之病史及藥品過敏史，尤其是曾對隆我心錠過敏者。
2. 請告訴醫師您目前正使用之藥品，尤其是制酸劑、抗生素、鈣片、類固醇、利尿劑、甲狀腺藥或其他心臟藥。
3. 孕婦、計劃懷孕或授乳婦女，請於開始服藥前告知醫師。
4. 如果您將要進行手術(含牙科手術)，請記得告訴醫師，您正在服用此藥。
5. 沒有醫師指示，請勿自行停藥或調整劑量。
6. 隆我心錠可能會導致嗜睡，請不要開車或操作危險機械。
7. 酒精會加重本藥引起之昏昏欲睡的感覺。
8. 旅行前請確定身邊有足夠的藥量。
9. 請勿讓他人服用您的藥品。

副作用及處理方式：

若有下列現象，請立即告知醫師或到急診處就醫

1. 心跳不規則、呼吸困難。
2. 噁心、厭食、嘔吐、食慾不佳。
3. 皮膚發疹、癢等症狀。
4. 視覺障礙：視力模糊或黃視〈視覺物體周圍有黃綠色色圈〉。
5. 疲倦、意識不清、四肢無力或刺痛感。

忘記服藥處理：

當天忘記服用，當日補服，勿隔日補服兩日份。

保存方法：

本藥需放在小孩無法取得處，並放在陰涼、乾燥的環境下保存。